



(뒷면)

# 독감 예방접종 전 주의사항 안내

접종 전에 아래 사항을 읽고 서명해 주세요.

## ※ 독감 예방접종 후 발생할 수 있는 합병증 ※

- ▣ 독감 예방접종자의 10~20%에서 접종 부위의 발적과 통증이 나타나며 대부분 1~2일 내에 사라집니다.
- ▣ 발열, 무력감, 근육통, 두통 등의 비 특이적 전신반응이 1% 미만에서 나타날 수 있으며 보통 예방접종 후 6~12시간 이내에 발생하여 1~2일간 지속됩니다.
- ▣ 드물게 접종 후 두드러기, 혈관부종, 아나필락시스 등의 과민반응이 나타날 수 있습니다.
- ▣ 계란 알레르기를 비롯한 알레르기 병력이 있는 분은 접종 전 의료진과 상담 후 접종을 진행해 주시고, 접종 후 급격히 발생할 수 있는 심각한 과민반응에 대한 빠른 조치를 위해 접종 후 30분가량 병원에서 대기 후 귀가하시기 바랍니다.
- ▣ 이전에 독감 예방접종 후 이상반응이 있었던 분은 접종 전 의료진과 상담해 주세요.

본인은 위 주의사항을 읽고 이해하였음을 확인합니다.

20      년      월      일

본인 성명 : \_\_\_\_\_ (서명)